

Dashboard Médico

Injeção Intravesical de Toxina Botulínica

Duração

15-30 min

Injeções

20-30

Recuperação

1-2 semanas

Eficácia

6-12 meses

Como é Realizado o Procedimento

1. Preparação: O paciente é posicionado em posição ginecológica e recebe anestesia local ou sedação leve para conforto durante o procedimento.

2. Cistoscopia: Um aparelho fino e flexível chamado cistoscópio é introduzido através da uretra até chegar à bexiga, permitindo visualização completa do interior.

3. Injeções: Usando uma agulha muito fina que passa pelo cistoscópio, o médico aplica 20-30 pequenas injeções de toxina botulínica em pontos específicos da parede da bexiga, evitando a região do trígono.

4. Finalização: Após todas as injeções serem realizadas, o cistoscópio é retirado cuidadosamente e o paciente é encaminhado para observação antes da alta.

Timeline do Procedimento

Pré-procedimento

Anestesia local ou sedação leve

0h

Cistoscopia

Introdução do cistoscópio através da uretra

5min

Injeções

20-30 injeções de toxina botulínica na bexiga

15-20min

Finalização

Retirada cuidadosa do cistoscópio

25-30min

Recuperação

Observação e alta hospitalar

1-2h

Taxa de Melhora dos Sintomas

Urgência Urinária

85%



Frequência Urinária

80%



Incontinência

75%



Qualidade de Vida

90%



Duração dos Efeitos

Os benefícios do tratamento duram tipicamente entre 6 a 12 meses, podendo ser repetido quando necessário.

Cuidados Pós-Operatórios

Hidratação

Beber bastante água nas primeiras 24 horas

Repouso

Evitar esforços físicos intensos por alguns dias

Monitoramento

Observar sinais de febre ou complicações

Acompanhamento

Retornar nas consultas agendadas

Sinais de Alerta

Entre em contato imediatamente com seu médico se apresentar:

Febre acima de 38°C

Dor intensa persistente

Impossibilidade de urinar

Sangramento intenso na urina

Lembre-se: Este é um procedimento seguro e eficaz quando realizado por profissional qualificado.

Tire todas as suas dúvidas com seu urologista antes e após o procedimento.